

Νεογνικός Έλεγχος Ακοής

Ασφαλής

Ανώδυνος

Περίπου 10 λεπτά

Τα περισσότερα μωρά κοιμούνται καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Σύμφωνα με έρευνες,

90%

των κωφών και βαρήκων παιδιών έχουν ακούοντες γονείς.

Ο νεογνικός έλεγχος ακοής κρίνεται απαραίτητος ακόμη και σε νεογνά χωρίς γνωστό κληρονομικό ή άλλο παράγοντα κινδύνου.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή της είναι καθοριστικής σημασίας.

Τι γίνεται αν το παιδί μου δεν περάσει τον έλεγχο;

Θα σας δοθούν πληροφορίες και συστάσεις από τον γιατρό σας για περαιτέρω διερεύνηση μέσω μιας πιο εξειδικευμένης εξέτασης. Εάν εξακριβωθεί η απώλεια ακοής, η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των γλωσσικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, βάσει του διεθνούς μοντέλου «1-3-6»:

1

Έλεγχος ακοής έως τον 1ο μήνα

3

Διάγνωση έως τον 3ο μήνα

6

Έναρξη παρέμβασης έως τους 6 μήνες

Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ακοή ενός παιδιού;

Οι παρακάτω παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με την απώλεια ακοής ενός παιδιού. Εάν ισχύει ένας ή περισσότεροι, είναι καλό να το συζητήσετε με τον γιατρό σας.

- Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό απώλειας ακοής.
- Παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στο σχήμα ή στην ανάπτυξη της κεφαλής, του προσώπου ή των αυτιών.
- Έχει παρουσιαστεί σοβαρή λοίμωξη πριν ή μετά τη γέννησή του, όπως ενδομήτρια λοίμωξη (π.χ. κυτταρομεγαλοϊός – CMV) ή βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
- Έχει παραμείνει για 48 ώρες ή περισσότερο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (MENN).
- Έχει παρουσιάσει σοβαρό νεογνικό ίκτερο.



**Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης
για οικογένειες με κωφά & βαρήκοα
βρέφη και νήπια**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αθήνα

210 6410714 · 6937209100
eparemvasi@idrimakofon.gr

Θεσσαλονίκη

2310 343079 · 6936780323
eparemvasi.thess@idrimakofon.gr

Πάτρα

eparemvasi.patras@idrimakofon.gr

www.idrimakofon.gr